

Pligttekst til offentligheden

ellaOne® 30 mg (ulipristalacetat) tablet

Virkning: Nødprævention til at forebygge graviditet efter ubeskyttet samleje eller efter svigt af svangerskabsforebyggende metode. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Må ikke anvendes som almindelig prævention. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for ulipristalacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer. Må ikke anvendes af personer med svær astma der er i behandling med glukokortikoider. Må ikke tages sammen med medicin, der indeholder levonorgestrel. Bør ikke anvendes af personer som har nedsat leverfunktion eller er på galactose- eller laktosefri diæt. Nogle typer medicin kan forhindre, at ellaOne virker effektivt. Tal derfor med lægen eller apotekspersonalet, ved brug af medicin til behandling af epilepsi, tuberkulose, hiv, svampeinfektioner eller naturlægemidler, der indeholder perikon (*Hypericum perforatum*). Ved svimmelhed, dødsighed, sløret syn og/eller manglende koncentration efter at have taget ellaOne®, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. Bruges aktuelt hormonbaseret prævention, fortsættes brugen efter ellaOne er indtaget. Dog skal kondom bruges ved samleje frem til næste menstruation. **Graviditet og amning:** Kan ikke anvendes under graviditet. Undlad amning i én uge efter at have taget ellaOne; brug af brystpumpe anbefales for at opretholde mælkeproduktionen, men moder mælken skal kasseres. **Bivirkninger:** *Almindelige:* Kvalme, mavesmerter eller ubehag, opkastning, stærke menstruationssmerter, bækkensmerter, ømhed i brysterne, hovedpine, svimmelhed, humørsvingninger, muskelsmerter, rygsmerter, træthed. *Ikke almindelige:* Diarré, halsbrand, luft i maven, tør mund, usædvanlig eller uregelmæssig kraftig/længerevarende menstruation, præmenstruelt syndrom, vaginal irritation eller udflåd, nedsat eller øget sexlyst, hedeure, appetitændringer, følelsesmæssig forstyrrelse, angst, ophidselse, søvnbesvær, søvnighed, migræne, synsforstyrrelser, influenza, akne, hudlæsioner, kløe, feber, kulderystelser, alment ubehag. *Sjældne:* Smerter eller kløe i kønsorganerne, smerter under samleje, brist af cyste på æggestokkene, usædvanligt svag menstruation, manglende koncentration, svimmelhed, rysten, desorientering, besvimelse, usædvanlig fornemmelse i øjet, rødt øje, lysfølsomhed, tør hals, smagsforstyrrelser, kløende udslæt, tørst. **Dosering:** 1 tablet tages hurtigst muligt efter samlejet, dog senest 120 timer (5 dage) efter samlejet. Ved opkastning indenfor 3 timer efter indtagelse af tabletten, tages en ny tablet hurtigst muligt. **Pakninger og priser:** 1 tablet. Se dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk. **Læs indlægssedlen grundigt inden brug.** Oktober 2018.

Midsona Danmark, Klostermarken 20, 9550 Mariager. Tel. 98 54 22 88 www.ellaone.dk.